ENDOSIMBIOSI

dalla biologia una lezione sulla risoluzione dei conflitti

Maurizio Casiraghi

Università degli Studi di Milano Bicocca

ZooPlantLab - Dip. Biotecnologie e Bioscienze

Piazza della Scienza 2 – 20126 Milano

maurizio.casiraghi@unimib.it

www.zooplantlab.btbs.unimib.it

Definire la simbiosi

Simbiosi:
dal greco: $\sigma\upsilon\nu$ = insieme; $\beta\iota\omicron\varsigma$ = vita

Anton de Bary

Simbiosi

Commensalismo

Mutualismo

Parassitismo

Simbiosi

Simbiosi

DOCTOR FUN

More unusual examples of animal symbiosis

L'endosimbiosi / simbiosi intracellulare

La teoria seriale dell'endosimbiosi

Lynn Margulis

La teoria seriale dell'endosimbiosi

Lynn Margulis

“life did not take over the globe by combat, but by networking”

La teoria seriale dell'endosimbiosi

La teoria seriale dell'endosimbiosi

A A prokaryote ingested some aerobic bacteria. The aerobes were protected and produced energy for the prokaryote.

B Over a long time, the aerobes become mitochondria, no longer able to live on their own.

C Some primitive prokaryotes also ingested cyanobacteria, which contain photosynthetic pigments.

D The cyanobacteria become chloroplasts, no longer able to live on their own.

animali

funghi

piante

La teoria seriale dell'endosimbiosi

mitocondrio

cloroplasto

La “promiscuità” di una cellula eucariote

II Tree of Life

Ernst Haeckel

Il *Tree of Life* – I regni della natura

Il *Tree of Life* – I domini della natura

Il *Tree of Life* alla luce delle simbiosi

Sì, bello, ma in fondo storia, ma in tutto la simbiosi “oggi”?

Numero di batteri ospitati dall'intestino umano:
100.000 miliardi

Numero di cellule dell'uomo:
10.000 miliardi

Numero di batteri associati al corpo umano:
150.000 miliardi

Numero di geni batterici nell'intestino umano:
> 300.000

Numero specie batteriche nell'intestino:
Circa 800

Numero di ceppi batterici:
Circa 7000

Batteri associati alla placca gengivale

“Non sono grasso, sono parassitato”

Vol 444 | 21/28 December 2006 | doi:10.1038/nature05414

nature

ARTICLES

An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest

Peter J. Turnbaugh¹, Ruth E. Ley¹, Michael A. Mahowald¹, Vincent Magrini², Elaine R. Mardis^{1,2} & Jeffrey I. Gordon¹

Endosimbiosi con “batteri”: una “abitudine” diffusa

Endosimbiosi – casi particolari

Autotrofo o eterotrofo?

Paramecium bursaria con *Chlorella*

Endosimbiosi – casi particolari

Hydra viridis
con *Chlorella*

Autotrofo o eterotrofo?

Endosimbiosi – casi particolari

Autotrofo o eterotrofo?

Endosimbiosi – casi particolari

Endosimbiosi – casi particolari

Elysia viridis

Placida dendritica

Plakobranchus sp.

Endosimbiosi – casi particolari

cloroplasti in cellula digestiva di *Elisia viridis*

Le simbiosi intracellulari con batteri

Simbiosi nutrizionali

Buchnera aphidicola e gli afidi

Eredità matrilineare dei simbionti

Utilizzo del DNA mitocondriale per la ricostruzione filogenetica

Most information from: Semino et al. The genetic legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in extant Europeans: a Y chromosome perspective. *Science* 290, 1155-1159 (2000). English sample: our study; Norwegian sample: Capelli et al. A Y chromosome census of the British Isles. *Curr. Biol.* 13, 979-984 (2003). * Haplogroups F* plus G.

Comparazione filogenetica ospite-simbionte

Le simbiosi intracellulari con i batteri

Evolutionary history	Features	Examples
<p>Bacteriome-associated obligate symbiont Ancient codiversification of host and symbiont, no symbiont exchange among lineages</p>	<p><i>Buchnera aphidicola</i> <i>Wigglesworthia glossinidia</i> <i>Blochmannia</i> species <i>Baumannia cicadellinicola</i></p>
<p>Ancient reproductive parasite Occasional horizontal transfer and recombination between hosts</p>	<p><i>Wolbachia pipientis</i> <i>Spiroplasma</i> species <i>Rickettsia</i> species</p>
<p>Facultative symbiont Occasional horizontal transfer Recent coalescence of symbiont lineages Recent symbiotic origin</p>	<p><i>Hamiltonella defensa</i> <i>Regiella insecticola</i> <i>Serratia symbiotica</i> <i>Arsenophonus</i> species</p>
<p>Time in millions of years → — Host lineage — Symbiont lineage</p>		

La simbiosi nutrizionale tra *Buchnera aphidicola* e gli afidi

La riduzione del genoma di *Buchnera aphidicola*

Figure 2
Part of a syntenic fragment from *Buchnera* and the ancestor (same as *E. coli* for this region). Deleted loci are white in the ancestor; orthologous genes are color-coded. Genes shifted up in the figure are oriented forward in the genome; genes shifted down are oriented backwards.

La riduzione del genoma di *Buchnera aphidicola*

Figure 3

Graphic depiction of syntentic fragments and lost regions in the genome of the reconstructed ancestor and in *Buchnera*. Syntentic fragments are color-coded based on position in the ancestor. Lost regions occurring between syntentic fragments are gray.

Le mosche tsè-tsè e *Wigglesworthia glossinidia*

Le mosche tsè-tsè e *Wigglesworthia glossinidia*

Le mosche tsè-tsè e *Wigglesworthia glossinidia*

Fig. 2 Cofactor biosynthetic pathways in *W. glossinidia* deduced from the gene set. The sequential pathways are represented by arrows, each indicating one step catalyzed by the enzyme named. The end product of each reaction is boxed. The question marks indicate steps for which no genes were found in the *W. glossinidia* genome. The *W. glossinidia* genome encodes the potential to synthesize biotin, thiazole, lipoic acid, FAD (riboflavin, B2), folate, pantothenate, thiamine (B1), pyridoxine (B6), protoheme and nicotinamide.

Le mosche tsè-tsè e *Wigglesworthia glossinidia*

Fig. 1 Linear representation of the *W. glossinidia* chromosome illustrating the location of each predicted coding sequences and RNA gene. The predicted coding sequences were compared with a non-redundant protein database for assignment of putative functions. In addition, pWig1 encodes spermidine N1-acetyltransferase, three putative membrane proteins with similarities to a mechano-sensitive channel protein (*ygg8*), a putative transmembrane protein of *Salmonella typhimurium* and a cation-transport inhibitor protein of *Neisseria meningitidis* (stomatin/Mec-2 family), respectively. Another of its predicted coding sequences products is homologous to TraT of the F incompatibility group plasmids. A small heat shock protein (*hsp*) is also encoded by the *Buchnera* plasmid.

Le mosche tsè-tsè e *Wigglesworthia glossinidia*

Fig. 3 Genes involved in the synthesis of flagellar assembly of *E. coli* K12 MG 1655. The pink boxes denote homologs present in the *W. glossinidia* genome and the green boxes show genes that are not present in *W. glossinidia*. *W. glossinidia* has retained genes encoding flagellar functions, including the basal body, hook, filament, filament cap regions and the integral membrane proteins required for motility functions, *motA* and *motB*. OM, outer membrane; P, periplasmic space; CM, cell membrane. Region III within the flagellar *fli* operon of *E. coli* and *S. typhimurium* is composed of two regions, IIIa and IIIb, with a disruption consisting of DNA unrelated to the flagellar system²⁹. The disruption is ancient, having taken place approximately 150 million years ago³⁰. The organization of the IIIa and IIIb region genes in *W. glossinidia* is continuous, however, suggesting that *W. glossinidia* predates the divergence of the two free-living bacteria.

Le mosche tsè-tsè e *Sodalis glossinidius*

Figure 1. Circular representation of the *Sodalis glossinidius* chromosome. The outer scale (indicated by numbers 1–4) is shown in megabases. From the outside in: circle 1, positive strand CDSs (red); circle 2, negative strand CDSs (blue); circle 3, pseudogenes (gray); circle 4, tRNA genes (green), rRNA genes (brown), genes for type III secretion systems (pink); circle 5, GC skew $[(G - C)/(G + C)]$; khaki indicates values >0; purple indicates values <0; and circle 6, G+C content (higher values outward).

... ma erosione

Le simbiosi intracellulari con i batteri

Evolutionary history	Features	Examples
<p>Bacteriome-associated obligate symbiont Ancient codiversification of host and symbiont, no symbiont exchange among lineages</p>	<p><i>Buchnera aphidicola</i> <i>Wigglesworthia glossinidia</i> <i>Blochmannia</i> species <i>Baumannia cicadellinicola</i></p>
<p>Ancient reproductive parasite Occasional horizontal transfer and recombination between hosts</p>	<p><i>Wolbachia pipientis</i> <i>Spiroplasma</i> species <i>Rickettsia</i> species</p>
<p>Facultative symbiont Occasional horizontal transfer Recent coalescence of symbiont lineages Recent symbiotic origin</p>	<p><i>Hamiltonella defensa</i> <i>Regiella insecticola</i> <i>Serratia symbiotica</i> <i>Arsenophonus</i> species</p>
<p>Time in millions of years → — Host lineage — Symbiont lineage</p>		

Le mosche tsè-tsè e *Sodalis glossinidius*

S. glossinidius e
Trypanosoma spp.

Anellidi: *Olavius algarvensis*

Isola d'Elba

Anellidi: *Olavius algarvensis*

La simbiosi tra *Olavius algarvensis* e due batteri

in verde: γ proteobatterio
in rosso: δ proteobatterio

testa di freccia: γ proteobatterio
freccia: δ proteobatterio

La simbiosi tra *Olavius algarvensis* e due batteri

in verde: γ proteobatterio
in rosso: δ proteobatterio

Olavius algarvensis

Autotrofo o eterotrofo?

Le simbiosi delle sorgenti idrotermali di profondità

Pogonofori: *Riftia pachyptila*

CO_2

Molluschi: *Bathymodiolus* sp.

CH₄

Artropodi: *Ixodes ricinus* e le zecche

Artropodi: *Ixodes ricinus* e le zecche

Artropodi: *Ixodes ricinus* e le zecche

Confronto tra le filogenesi di *Midichloria* (A) e delle zecche ospiti (B).

Non c'è corrispondenza

Possibile trasferimento orizzontale

Artropodi: *Ixodes ricinus* e le zecche

(No probe)

(Gamma-proteobacteria
specific probe)

(RNase control)

Il batterio è specifico degli ovari delle zecche

Artropodi: *Ixodes ricinus* e le zecche

Il batterio è trasmesso per via transovarica

Artropodi: *Ixodes ricinus* e le zecche

Il batterio invade i mitocondri...

Artropodi: *Ixodes ricinus* e le zecche

e li degrada

In natura esistono batteri “predatori”

Similarità con il ciclo vitale di *Bdellovibrio* spp.

Ixodes ricinus e *Mitochondria mitochondrii*

Ruolo di *Midichloria mitochondrii*

Mutualista o Parassita?

Distrugge i mitocondri

Parassita?

Prevalenza 100%
Nelle femmine

Mutualista?

Si perde in laboratorio

Mutualista non
obbligato?

I maschi sono un
vicolo cieco

Parassita della
riproduzione?

Ixodes ricinus e *Midichloria mitochondrii*

Anakin : "Posso chiederti una cosa?" "Cosa sono i midichlorian?"

Qui-Gon Jin: "I midichlorian sono microscopiche forme di vita che risiedono nelle cellule di tutti gli esseri viventi e che comunicano con la forza."

"Vivono dentro di me?" chiese il ragazzo.

"Nelle tue cellule. Noi siamo in simbiosi con i midichlorian."

(Adattato da 'Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma' Terry Brooks)

Midichlorian count

- **Obi-Wan Kenobi**
13.400

- **Luke Skywalker 14.500**

- **Yoda 17.700**

- **Darth Vader**
27.700

(Darth Fener)

Midichlorian count

- *Ixodes ricinus*
1.000.000!!

Midichlorian count

- Forte aumento del simbionte dopo il pasto di sangue
- Diminuzione drastica dopo il passaggio da uno stadio all'altro, tranne nella muta ninfa/adulto

Ruolo di *Mitochondria mitochondrii*

Artropodi e nematodi – *Wolbachia pipientis*

Le filarie

Ciclo vitale di *Dirofilaria immitis*

Dirofilaria immitis Life Cycle

Le filarie e *Wolbachia pipientis*

W. pipientis nelle corde laterali

Dirofilaria immitis

Wolbachia pipientis

Assenza di una tassonomia “sicura”: supergruppi

Wolbachia pipientis

Assenza di una tassonomia “sicura”: supergruppi

Wolbachia pipientis

Assenza di una tassonomia "sicura": supergruppi

Wolbachia pipientis nelle filarie

Wolbachia pipientis: cure antibiotiche

Un simbiote trasmesso per via verticale ha due possibili opzioni evolutive:

Parassitismo riproduttivo

Sterilizzazione, o comunque azione negativa, verso quegli individui che non trasmettono il simbiote⁽¹⁾. Alternativamente distorsione del rapporto sessi⁽²⁾

Se il simbiote è trasmesso attraverso le femmine può:

- (1) indurre incompatibilità citoplasmatica
- (1) uccidere gli embrioni maschi
- (2) femminizzare maschi genetici
- (2) indurre partenogenesi

Mutualismo

Ruolo benefico per quegli individui che trasmettono il simbiote

Le wolbachiae degli artropodi fanno tutto questo

Ma fanno anche

e anche

vero parassitismo

W. pipientis: incompatibilità citoplasmatica

Le simbiosi: parassitismo vs mutualismo

“Secondo me la domanda più importante da porsi a proposito di qualunque **parassita** è questa:

i suoi geni sono trasmessi alle generazioni successive per mezzo degli stessi veicoli usati dai geni dell'ospite?

Se non lo sono, mi aspetto che il parassita **danneggi** l'ospite, in un modo o nell'altro; ma se invece lo sono, il parassita farà tutto ciò che può per **aiutare** l'ospite, non solo a sopravvivere ma anche a riprodursi. Nel corso dell'evoluzione cesserà di essere un parassita, coopererà con l'ospite e alla fine potrà anche fondersi con i suoi tessuti e diventare **del tutto irriconoscibile** come parassita. Forse [...] le nostre cellule hanno affrontato problemi simili molto tempo fa e noi tutti siamo derivati da antiche fusioni di parassiti.”

da 'Il gene egoista' di Richard Dawkins (2^a edizione, 1989)